



# หากถูกกัดแล้ว ควรปฏิบัติตนอย่างไร ?



1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด  
ฟอกสบู่เบาๆ ให้ถึงกันแผล  
และล้างออกให้หมด  
(ทำซ้ำเป็นเวลานาน 15 นาที) การล้างแผล  
จะช่วยลดปริมาณเชื้อได้ถึง **80%**



2. ทายาเบตาดีน  
และรีบมาพบแพทย์  
โดยเร็วที่สุด เพื่อรับการรักษา  
และฉีดวัคซีนป้องกันโรค



3. กักสุนัขเพื่อดูอาการ **10 วัน**  
ถ้าตายให้นำซากมาตรวจ แต่ถ้าไม่ตาย  
แสดงว่าสุนัขตัวนั้นไม่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า



4. ฉีดวัคซีนต่อให้ครบตามนัด  
และควรเข้ารับวัคซีน  
ให้ตรงตามที่แพทย์นัด



# ป้องกันสุนัขกัด ได้อย่างไร ?



หลักคณา **5 ย.** ได้แก่  
“อย่าเหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก  
อย่าหยิบ อย่ายุ่ง”



1. **อย่าเหย่**  
ให้สุนัขโมโห



2. **อย่าเหยียบ** สุนัข  
หรือทำให้ตกใจ



3. **อย่าแยก** สุนัขที่กำลังกัดกัน  
ด้วยมือเปล่า



4. **อย่าหยิบ** ชามอาหาร  
หรือของที่สุนัขหวง



5. **อย่ายุ่ง** กับสุนัขจรจัด  
หรือสุนัขที่ไม่ทราบประวัติวัคซีน



# โรค พิษสุนัขบ้า



โทรศัพท์ ๐๔๔ ๙๘๔๐๐๕



# โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดได้ใน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว โค กระบือ สุกร รวมถึงคน เมื่อได้รับเชื้อ หากปล่อยไว้จนเกิดอาการ จะเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน



ปัจจุบันยังไม่มียารักษา  
โรคพิษสุนัขบ้า



## สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีอาการอย่างไร?



สัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อาจแสดงอาการได้ 3 ระยะ ได้แก่

### 1. ระยะเริ่มแรก



มีอาการซึมและนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม กินข้าว กินน้ำลดลง

### 2. ระยะตื่นเต้น

กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง กัดทุกสิ่งไม่เลือก วังโล่กัดคนหรือสัตว์



### 3. ระยะอัมพาต

ค้างคอก ลิ้นห้อยสีแดงคล้ำ น้ำลายไหล ทรงตัวไม่ได้ เป็นอัมพาตและตาย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะติดจากสัตว์ที่มีอาการเหล่านี้



## ติดเชื่อได้ทางไหนบ้าง ?

สามารถติดเชื่อโรคพิษสุนัขบ้าได้ 2 ทาง คือ

1. ถูกกัดหรือข่วน ทำให้น้ำลายของสัตว์เข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล แม้แผลเพียงเล็กน้อยก็สามารถติดเชื่อได้



2. ถูกเสียดต่อบาดแผล รอยถลอกหรือรอยขีดข่วน รวมทั้งริมฝีปากหรือนัยน์ตา



## อาการโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไร ?

(ผู้ป่วยจะแสดงอาการ หลังได้รับเชื้อประมาณ 3 สัปดาห์ - 6 เดือน หรืออาจนานถึง 1 ปี)

- **อาการเริ่มแรก:** ไข้ต่ำ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย และคันรุนแรงบริเวณแผลที่ถูกกัด
- **อาการทางประสาท:** กระสับกระส่าย คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง มีอาการหนาวสั่น กลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลว
- **อาการระยะสุดท้าย:** กล้ามเนื้อเกร็ง - กระตุก แขนขาอ่อนแรง หายใจไม่ออก แขนหน้าอก หดสติและเสียชีวิตในที่สุด

